



Einnahme von METRELEF:


4 Sprühstöße über
den Tag verteilt:




morgens (6-8 Uhr)



mittags (11-13 Uhr)



nachmittags (16-18 Uhr)



abends (21-23 Uhr)

Blockade der Hypophysenfunktion zur Vorbereitung der Ovulationsinduktion:

Die initiale Tagesdosis beträgt 0,6 mg Buserelin (entsprechend 4 Sprühstößen zu je 0,15 mg Buserelin) über den Tag verteilt (siehe Spalte links).

Je nach Dosierung ergibt sich für eine Flasche folgende Anwendungsdauer:

Tagesdosis 0,6 mg: 1 Flasche METRELEF reicht für 21 Tage.

- **Eine Unterbrechung der Nachtruhe ist nicht notwendig!**
- **Erkältung beeinflusst den Therapieerfolg nicht negativ.**
- **Die vorgegebene Dosierung ist unabhängig vom Körpergewicht.**

Hinweise:

Damit der jeweils gewünschte Behandlungserfolg mit METRELEF eintreten kann, sollte die Dosierung gewissenhaft eingehalten werden. Daher wird empfohlen, METRELEF jeweils zu den Mahlzeiten vor oder nach dem Essen zu verabreichen. Es kann aber auch zu anderen Zeiten angewendet werden, sofern gleichmäßige Abstände (zur Vorbereitung der Ovulationsauslösung 4-6 Stunden) zwischen den einzelnen Gaben eingehalten werden.

Lagerhinweise:

Zwischen +2 °C und +8 °C aufbewahren und lagern. Nicht gefrieren lassen. Die geöffnete Flasche kann 5 Wochen bei Raumtemperatur, aber vor direkter Wärmeeinwirkung geschützt, aufbewahrt werden. Reste von METRELEF sind danach zu verwerfen.

FERRING Arzneimittel GmbH

Fabrikstraße 7, 24103 Kiel

Fon 04 31 - 58 52 - 0

Fax 04 31 - 58 52 - 74

e-Mail info-service@ferring.de

Web www.ferring.de

FERRING

ARZNEIMITTEL