



Anwendung von **GONASI®**:

Wir verwenden es an Stelle von Utrogest, Duphaston, oder Prolutex in 1. Linie in **niedriger Dosierung a 100 I.E./Tag** zur Stützung der Lutealphase (Gelbkörperphase) nach dem Eisprung **ab dem 1. Tag nach der Ovulation (= Follikelpunktion) bis zum einschließlich 9./10. Tag nach der Ovulation** nach einer vorherigen **Auslösung mit einem GnRh-Analogon** (z.B. Triptofem 0,2 oder Decapeptyl 0,2)

Der Inhalt einer **Wirkstoff-Ampulle 250 I.E.** (Pulver) wird mit dem **Lösungsmittel** aus der dazugehörigen 1-ml-Spritze **gemischt**.



Lösungsmittelspritze aus Packung



Spritze und Nadeln von der Apotheke

Aus der Ampulle **0,4 ml (=100 I.E.)** in die Lösungsmittelspritze, aus der Sie zuvor das Wasser in die Pulverampulle gespritzt haben, herausziehen und nach Aufsetzen der kurzen Sub-Cutan-Nadel (s.c. - unter die Haut) rechts oder links vom Bauchnabel in die Bauchdecke injizieren. Danach kann die Spritze verworfen werden.

Nach der Injektion am 1. Tag die Ampulle mit dem Rest der Mischung **im Kühlschrank bei 2 - 8° Celsius aufbewahren** (auch wenn es im Waschzettel steht, dass man die Lösung frisch verspritzen und nicht lagern soll, ist das gut möglich und die Mischung verliert für einen weiteren Tag nicht an Wirkung). Von der Apotheke sollen Sie zusätzlich wenigstens noch vier weitere 1-ml-Spritzen, vier lange Nadeln zum Aufziehen von Flüssigkeit und vier kurze s.c.-Nadeln bekommen.

Am **folgenden Tag** mit der langen Nadel wieder 0,4 ml (=100 I.E.) der fertigen Mischung mit der Spritze aus der Apotheke aufziehen und mit der s.c.-Nadel, wie am Vortag, in die Bauchdecke injizieren.

Der Rest von 0,2 ml wird verworfen, d.h. für **alle 2 Tage** wird **eine Ampulle** benötigt. Da die Packungsgröße aus 3 Ampullen besteht, werden **2 Packungen benötigt** und nach 10 Tagen bleibt 1 Ampulle ungenutzt übrig.